

Nome _____

Turma _____

N.º _____

2minutos.pt/episodios/20

O rastreio fica para o ano?

Vê o episódio e lê atentamente o texto que se segue.

A implementação do exame de rastreio do cancro do colo do útero tornou-o um dos cancros mais simples de prevenir. Contudo, ainda há mulheres que não o fazem regularmente. Será que é um exame que se pode adiar? Quais as vantagens de o fazer regularmente?

O cancro do colo do útero é causado pelo vírus do papiloma humano (HPV), um vírus que é transmitido sexualmente. A infeção por HPV é muito comum na população sexualmente ativa, e na maioria dos casos desaparece de forma natural ao fim de 2 anos. Porém, quando a infeção perdura, o que é raro, e se a estirpe do HPV for de alto risco, o que é ainda mais raro, pode desenvolver-se um cancro. É neste cenário que o rastreio do cancro do colo do útero é determinante, uma vez que desde a infeção até ao eventual desenvolvimento de um cancro podem passar 20 a 25 anos. Durante este período alargado, o rastreio possibilita a deteção do vírus e/ou de lesões pré-cancerosas, ou mesmo cancros em estados iniciais, mais fáceis de tratar.



Todas as mulheres devem fazer o rastreio do cancro do colo do útero.

No entanto, o cancro do colo do útero ainda é o 2.º mais mortal entre as mulheres jovens europeias. Para inverter estes dados é crucial que todas as mulheres façam o rastreio com regularidade – as mortes por cancro do colo do útero acontecem maioritariamente em mulheres que nunca fizeram o teste de rastreio.

Durante muitos anos o principal método de rastreio de cancro do colo do útero foi a citologia cervico-vaginal, mais conhecida por teste de Papanicolau. Após salvar muitas vidas, o teste de Papanicolau está a ser substituído por outro exame ainda mais preciso: o teste de HPV, que é um exame rápido e indolor que deteta a presença do HPV, em especial as estirpes de alto risco, nas células da região cervicovaginal.

No caso do exame detetar a presença do HPV não há razão para alarme. A infeção é muito comum nas pessoas sexualmente ativas, e um teste positivo não significa que haja um cancro. Nestes casos o médico poderá requerer exames complementares e fazer um acompanhamento mais regular. O rastreio do cancro do colo do útero deve ser feito por todas as mulheres com mais de 25 anos e deve ser repetido a cada 5 anos.

Apesar de o rastreio do HPV ser muito eficaz, é fundamental seguir as medidas de proteção:

- Tomar a vacina contra o HPV, que faz parte do Programa Nacional de Vacinação e é gratuita para as raparigas com idades entre os 10 e os 13 anos. Quem está fora desta faixa etária pode também fazer a vacina, mas não será gratuita. A vacina previne 90% dos casos de cancro do colo do útero e a maioria dos casos de verrugas genitais.
- Reduzir o número de parceiros sexuais, para reduzir o risco de infeção por HPV. O uso do preservativo reduz esse risco, mas não o elimina: a transmissão do HPV dá-se por contacto da pele com pele e/ou mucosas, e ainda que o preservativo reduza a área de contacto, não a elimina. A proteção da transmissão do vírus ronda os 70%.

Questões*

1. O cancro do colo do útero é causado...

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> pelo vírus do papiloma humano (HPV). | <input type="radio"/> pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). |
| <input type="radio"/> por <i>Helicobacter pylori</i> . | <input type="radio"/> nenhuma das anteriores. |

2. Qual é o método de rastreio do cancro de colo do útero mais recente?

- | | |
|--|---|
| <input type="radio"/> Vacina contra o HPV. | <input type="radio"/> Exame de Papanicolau. |
| <input type="radio"/> Teste de HPV. | <input type="radio"/> Colposcopia. |

3. O rastreio do cancro do colo do útero por Teste de HPV...

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> cura lesões pré-cancerosas ou cancros. | <input type="radio"/> elimina a infeção por HPV. |
| <input type="radio"/> evita a infeção por HPV. | <input type="radio"/> detecta o HPV e as estirpes que causam cancro. |

4. Quem deve fazer o rastreio do cancro do colo do útero?

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> Todas as mulheres. | <input type="radio"/> As mulheres com mais de 25 anos. |
| <input type="radio"/> Apenas as mulheres que não foram vacinadas contra o HPV. | <input type="radio"/> Apenas as mulheres que foram vacinadas contra o HPV. |

5. Quais as medidas de proteção que complementam o rastreio do cancro do colo do útero?

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> Vacinação contra o HPV. | <input type="radio"/> Uso do preservativo. |
| <input type="radio"/> Redução do número de parceiros sexuais. | <input type="radio"/> Todas as anteriores. |

6. Explica por que razão o rastreio do cancro do colo do útero é iniciado relativamente cedo (aos 25 anos).
